

Hvorlang tid skal der gå fra blodfortyndende er givet, til der kan anlægges/fjernes epi/spinal

- 1) Udregn døgndosis
 - 2) Find døgndosis i skema
 - 3) Aflæs hvormange timers pause i skema
- Dette er pausen uanset størrelsen på den sidst givne dosis

Tid fra medicin til instrumentering i ryg	Døgndosis	Pause
Innohep	≤ 3.500 IE	Ingen
Tinzaparin	> 3.500 og ≤ 4.500	min 10 timers
	> 4.500	min 20 timers
Fragmin	≤ 2.500 IE	Ingen
Dalteparin	> 2.500 og ≤ 5.000	min 10 timers
	> 5.000	min 20 timers
Klexane	≤ 20 mg	Ingen
Enoxaprin	> 20 og ≤ 40	min 10 timers
	> 40	min 20 timers

Tid fra instrumentering i ryg til medicin givning	Profylakse dosis	4 timer
	Fuld terapeutisk dosis	20 timer

Tid = fra sidste indgift, uanset dosis
(fx hvis døgndosis er delt med 2)

Instrumentering i ryg = anlæggelse eller fjernelse af epiduralkateter eller anlæggelse af spinal

https://dsth.dk/pdf/gravid_final_2023.pdf

TROMBOCYTTER	COMFORT	MORBIDITY	MORTALITY
EPIDURAL	100	80	50
SPINAL	100	50	30

INR bør være $< 1,5$ forud for neuroaxial blokade

<http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/08/Pr%C3%A6klampsi-guideline-PDF-dasaim-2017-sept.pdf>

