

Sectio Lejring: 10-15 grader ve; kip; Celeston uge 24- 34
Postpartum: Synto 5 IE iv langsomt (max 1 IE/min) (el. 10 im)

Generel Anæstesi. Spørg til: Allergi, Sygdom, Tidl. anæstesi problemer, Luftvejsbedømning
Prop 2,5-3mg/kg; Suxa 1-1,5mg/kg. Tube: 6,0 el 7,0. Efter forløsning: Fentanyl 5-6 yg/kg; iv.

Spinal Under L3, Marcain Tung 2,3ml + Sufenta 0,5ml;
1) Inf Metaoxidrin (0,1 mg/ml) 30 ml/t -> (ved fald BT)
2) Bolus pumpe Metaox 0,5-1 ml OG øg infusionshastighed OG tjek infusionsvæsken ikke er tom->
3) Efedrin 5-10 mg iv ->
4) Ve sideleje

Top-up epi Giv først 5 ml af nedenstående bland., vent 3-4 min, før resten gives

Lidocain/Adrenalin 15-20 ml +

Sufenta 2ml +

Bicarb (8,4%) 2ml +

Efter forløsning: Marcain (1,25mg/ml) 5 ml/t i 8 timer

Præeklampsi

Antihypertensiv beh, gerne Syst BT < 150 OG diast 80-100 før epi/anæstesi.

Spinal (hvis TRC > 50); GA (hvis TRC < 50); Svær: PE max 3 timer gamle prøver; let: PE max 6-8 timer.

CAVE iv væske; Methergin er kontraindiceret

Rapifen 1-2 mg el. Remifentnil 100-200 yg ved induktion GA;

Magnesium 4,9g bolus over 10 min

Propo=Propofol 10 mg/ml; Sufenta 5µg/ml; Marcain Tung 5mg/ml; Rapifen 50 mg/ml; Lidocain/Adrenalin 20mg/5yg

Fødselsanalgesi

Fødepi Bupivaca 1,25/Sufenta 1; 10 ml; 5ml/t

Fødespinal Marcain Tung 0,5ml+Sufenta 0,5 ml+
Saltvand 1ml (nål/Marcain/Sufenta hentes på OP)

Fastsiddende placenta/forløsningskader

Spinal Marcain Tung 0,8-1,4 ml(+Sufenta 0,5ml)

Top-up Sufenta 2-4ml+Lido/adren 10 ml+ Bicarb 1 ml

Stor Post Partum Hæmoragi

Årsag: Toni; Traume; Tissue; Trombe(-pati)

KAD, Aortakompression, Trendelenburg, stor iv adgang, Tranexamsyre 1 g (CAVE opkast). 0-neg blod hentes og Akutpakke (4:4:2) bestilles.

Induk: Prop 0,5-1,5 mg/kg eller Ketamin 1 mg/kg & Suxa 1 mg/kg

TEG + Fib-TEG el. ROTEM (Blåt glas), BAC (Lilla glas), A-gas, Bear-hug, evt. Re- TXA (Hgb, TRC, APTT, PP/INR, Fibrinogen, D-dimer, antitrombin)

ATONI: Skift til TIVA, 1)Synto inf (20ie i 0,5 l NaCl) 100 ml/min -> 2)Methergin 0,2 mg im/iv (CAVE PE) -> 3)Prostifenem (0,25 mg im)

Fibrinogen 25 mg/kg (ved funktionel S-fib<1,5)

Postoperativ: Blødning 0-2½ l: celebra 200 mg; >2½ l :
evt. kun tabl. PCM og tabl. morfin