UTEROTONICA – dosering ved atoni ifm. sectio eller postpartum blødning

Generisknavn/ Handelsnavn	Adm.	Dosis	Detaljer
Oxytocin (Syntocinon®)	l.v. l.m. l.u.	**Bolus** 5 IE **Infusion** 40 IE i 1000 ml isot. NaCl	Indgift er forbundet med hypotension, kvalme, takykardi og myocardieiskæmi ved for hurtig indgift. Bolus gives med 1 IE pr min Syntocinon virker antidiuretisk og kan forårsage væskeretention med svær hyponatriæmi. **Forventet virkning efter ca. 1 minut (i.v.) og 2-4 minutter (i.m.).** Virkningsvarighed 30-60 minutter efter i.m. administration. **Virkningen indtræder gradvis ved i.v. infusion.** **Virkningsvarighed efter afsluttet infusion ca. 20 minutter.** Infusion startes med 150-200 ml/time. Ved svær atoni bør det IKKE administreres med dråbetæller men gives over infusionspumpe for at sikre stabilt indløb
Carboprost (Prostinfenem®)	l.m. l.u.	0,25 mg (1 ml)	Stoffet bør gives forsigtigt, da det kan give hypotension. Det kan udløse anfald hos patienter kendt med svær astma. Peak koncentration opnås efter 20-30 min og T½ 3 timer. Anslagstid og effektvarighed ikke direkte beskrevet. **Kan gentages med 10-15 minutters interval. Totaldosis bør ikke overskride 2 mg (8 doser af 0,25 mg).**
Methylergometrin (Methergin®)	l.v. l.m.	0,2 mg (1 ml)	Stoffet er *kontraindiceret* hos kvinder med præeklampsi, da det øger blodtrykket som følge af karkontraktion. **Virkning indtræder efter 30-60 sekunder (i.v.) og 2-5 minutter (i.m.). Virkningsvarighed 4-6 timer.** **Kan gentages x 2** (DSOG: Indgift af 0.2mg kan gentages hver 2-4 timer)

Supplerende tiltag:

● Overvej calcium subst. **5 mmol CaCl iv** givet langsomt. ● Tydelig kommunikation med løbende status. ● Overvej **BAKRI** ballon og husk **Tranexamsyre**.

SUH Roskilde Anæstesi, Anne Wikkelsø Jan 2024