

# Fastkilet fosterhoved: en obstetrisk akut situation

## Huskeregul (ALARM)

**Alarm:** "Fastkilet hoved" siges højt af operatør (specialist tilkaldes)

**Lower:** operationsbord og trendelenburg

**Angle:** Ekstender hud og fascie (afvent klip udvidelse af uterotomi)

**Relax:** Uterus (NTG, ventoline, præoxygener)

**Maneuvers:** Først reverse breech (eller modificeret armene først udgave). Andre manœuvre: skub op på skuldre, skift operatør, skub nedefra er sidste udvej (OBS kraniefrakturer)

## Overvej Fetal Pillow præoperativt på OP lejet ved (de 4 C'er)

- Cervix fuldt dilateret
- Caput dybtstående
- Cup
- DystoCi
- → Adviser anæstesen mhp. at overveje tokolyse

## Anæstesen

- **Sænke lejet samt trendelenburg**
- **NGT** 0,25mg iv eller 0,4mg subling. Spray (= gange 1) og/eller **ventoline** 0,25mg i.v.
- **NTG kan gentages** 4 gange med 1 minuts mellemrum (OBS blodtryk)
- Overvej **general anæstesi**, efter intubation sevofluran-inhalation 8% (OBS aspirations- og luftvejsrisiko)

Kujabi et al., Ugeskrift for Læger 2021; 183